SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE Spółka Akcyjna
ul. Jana Pawła II 2 ● 57-320 Polanica Zdrój ● centrala: 74 86 21 100 ● FAX 74 86 21 102 ● www.scm.pl
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961 KRS: 0000438391,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 65 1090 2327 0000 0001 0685 0351
I cz. Kod res.000000019866/ V cz. Kod res. 01

KZ-ZDO-001/A-D01
Załącznik nr 1 /QP-004/O

FORMULARZ ZGODY

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Nazwisko i Imię: ……. .....

Data urodzenia: .....Płeć: .....

Adres: .....

PESEL: .....

IDENTYFIKATOR PACJENTA
(MIP jeśli nadany)

……

Nr Ks. Gł.:.....

Nr Ks. Oddz.: .....

Oddział: .....

I. Informacje o osobach uprawnionych do wyrażenia zgody

w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania:

Nazwisko i imię: .....

Adres: .....

Ankieta i zgoda na wykonanie badania TK i RTG z dożylnym podaniem środka kontrastowego

Pacjent musi posiadać skierowanie lekarskie.

Badanie tomografii komputerowej jest badaniem obrazowym , które wykonuje się z użyciem promieniowania rentgenowskiego. Promieniowanie rtg może mieć niekorzystny wpływ na organizm ludzki, dlatego dawka promieniowania podczas badania tomografii komputerowej jest zredukowana do najmniejszego poziomu, zapewniającego uzyskanie poprawnych technicznie obrazów. W metodzie tej wykorzystuje się zjawisko różnego pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez różne tkanki ciała.

W przypadku badań Tomografii Komputerowej pacjent kładzie się na specjalnym ruchomym stole, który przesuwany jest do wnętrza aparatu – daje to możliwość uzyskania obrazu wielu warstw ciała pacjenta. W przypadku urografii , pacjent również kładzie się na specjalnym stole – uzyskuje się obraz płaszczyznowy jamy brzusznej. Pacjent powinien być nieruchomy w trakcie badania i wykonywać instrukcje lekarza lub technika w celu uzyskania lepszej jakości zdjęć.

Przy badaniu dzieci może zaistnieć konieczność znieczulenia ogólnego.

Badanie jest bezbolesne. Na czas badania należy ubrać się w luźne i wygodne ubranie bez metalowych dodatków takich jak guziki, klamry, agrafki, broszki. Do badania trzeba zdjąć biżuterię, okulary, aparat słuchowy, protezy ruchome oraz części garderoby okolicy badanej. Do badania urografii należy odsłonić całą jamę brzuszną. Szczególnie istotne jest zapewnienie ochrony przed promieniowaniem kobiet w ciąży i dzieci.

Badania TK u kobiet w wieku rozrodczym zaleca się wykonywać w 1-10 dniu cyklu.
Ciąża jest przeciwwskazaniem do badania radiologicznego , zwłaszcza Tomografii Komputerowej - wykonywanie go jest ograniczone do niezbędnych przypadków, jeżeli badanie nie może być przeprowadzone po rozwiązaniu (po wyczerpaniu innych metod diagnostycznych oraz w przypadkach zagrożenia życia matki lub płodu).

Wszystkie kobiety powinny zgłaszać fakt podejrzenia lub bycia w ciąży przed wykonaniem badania.

Pacjent do badania powinien:

- Przynieść ze sobą wcześniejsze zdjęcia i wyniki TK, REZONANSU MAGNETYCZNEGO , RTG, USG oraz inną posiadaną dokumentację medyczną
- Przynieść dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
- Przynieść książeczkę zdrowia dziecka celem dokonania wpisu wykonania badania dziecka z użyciem promieniowania jonizującego
- Przynieść do badania jamy brzusznej i miednicy 1 l wody niegazowanej lub przegotowanej oraz w przypadku badania miednicy małej u kobiet, dodatkowo 1 tampon OB.
- Dostarczyć aktualny wynik poziomu kreatyniny w surowicy krwi.

W większości badań tomografii komputerowej oraz niektórych innych radiologicznych np. urografii konieczne jest dożylne podanie środka kontrastowego. Pacjent powinien zgłaszać się do badania na czczo (minimum 4-5 godzin bez posiłku). Jeśli osoba badana przyjmuje leki na stałe, to powinna je przyjąć w dniu badania popijając małą ilością wody. Osoby przyjmujące insulinę powinny umówić termin badania na rano i zabrać ze sobą insulinę i pierwsze śniadanie. W przypadku badania TK jamy brzusznej i miednicy małej , pacjent powinien dzień wcześniej zjeść lekki obiad i od godz. 14.00 wypić 3 saszetki Fortransu , rozpuszczone w 3 l wody , celem wyczyszczenia jelit. W przypadku podania dożylnie kontrastu mogą wystąpić działania niepożądane- uczucie gorąca, metalicznego smaku w ustach, zaczerwienie twarzy. W przypadku niepokojących odczuć należy powiadomić o tym personel medyczny. W razie wystąpienia u pacjenta podczas badania objawów niepożądanych, może ono być w każdej chwili przerwane, w celu oceny tych objawów i wdrożenia właściwego postępowania medycznego. W rzadkich przypadkach badanie może być przerwane z przyczyn technicznych z powodu awarii aparatu. U niektórych pacjentów w trakcie badania lekarz radiolog może zadecydować o poszerzeniu zakresu badania w stosunku do zakresu określonego na skierowaniu. Reakcje uczuleniowe najczęściej pojawiają się w ciągu pierwszych 20 minut od podania środka cieniującego (rzadko po 24-48 godzinach). Zaleca się pozostanie pacjenta w pracowni przez 30 min po badaniu , w celu obserwacji reakcji na padanie środka kontrastowego.

Możliwe wczesne działania niepożądane po podaniu jodowych środków kontrastowych:

- lekkie – nudności, wymioty, pokrzywka, świąd skóry, chrypka, kaszel, kichanie, obfite pocenie się, uczucie ciepła;
- umiarkowane – omdlenie, ciężkie wymioty, rozległa pokrzywka, obrzęk twarzy, obrzęk krtani, skurcz oskrzeli;
- ciężkie – drgawki, obrzęk płuc, wstrząs, zatrzymanie oddechu, zatrzymanie krążenia.

Możliwe opóźnione działania niepożądane po podaniu jodowych środków kontrastowych:

- reakcje skórne – wysypka, świąd, obrzęk;
- reakcje ogólnoustrojowe – bóle, zawroty głowy, nudności, biegunka, dreszcze, skurcze mięśni, objawy grypopodobne;
- opóźnione bóle rąk, inne reakcje.

Podwyższone ryzyko pojawienia się reakcji alergicznych występuje w przypadkach:

- powikłania po poprzednim podaniu środka cieniującego,
- alergia,
- astma,
- paraproteinemia (szpiczak, choroba Waldenstroma),
- niewydolność układu krążenia i układu oddechowego,
- niewydolność nerek (stężenie kreatyniny w surowicy krwi)
- niewydolność wątroby,
- wiek powyżej 65 lat,
- dzieci do lat 10, zwłaszcza w okresie noworodkowym, niemowlęcym i wczesnodziecięcym.

U tych chorych powinno podawać się niejonowe środki kontrastowe W przypadku zlecenia przez lekarza badania Tomografii Komputerowej z dożylnym środkiem kontrastowym, każdy pacjent powinien wyrazić świadomą, pisemną zgodę na jego zastosowanie.
W niektórych badaniach tomografii komputerowej (ocena jamy brzusznej, miednicy) konieczne jest ponadto wcześniejsze doustne, ewentualnie również doodbytnicze podanie środka kontrastowego. Środek kontrastowy podany doustnie, ewentualnie doodbytniczo, może wywołać biegunkę, która ustępuje z chwilą opróżnienia jelita ze środka kontrastowego. U pacjentów z zapaleniem jelit choroba może czasowo zaostrzyć się.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów po wykonaniu badania z dożylnym podaniem kontrastu, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Zaleca się wypicie większej ilości płynów po badaniu z podaniem środka kontrastowego

ANKIETA PRZED BADANIEM RENTGENOWSKIM/TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ, UROGRAFII, BADANIEM Z DOŻYLNYM PODANIEM ŚRODKA KONTRASTOWEGO

Prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie poniższej ankiety. Informacje podane objęte są tajemnicą zawodową, nie będą wykorzystywane do innych celów niż medyczne.

Wzrost …….. cm Waga ……kg

OŚWIADCZENIE PACJENTA (proszę zakreślić krzyżykiem właściwą odpowiedź):

Czy jest Pan/Pani na czczo ? (min. 5 godz. przed badaniem) ☐TAK ☐ NIE

Czy choruje Pan(i) na: (proszę zakreślić krzyżykiem właściwą odpowiedź)
choroby tarczycy ☐TAK ☐NIE, nerek ☐TAK ☐NIE , wątroby ☐TAK ☐ NIE, astmę ☐TAK ☐NIE,
nadciśnienie tętnicze ☐TAK ☐ NIE, padaczkę ☐TAK ☐NIE, cukrzycę ☐TAK☐NIE

Czy kiedykolwiek wystąpiły reakcje uczuleniowe na podanie środków farmaceutycznych ? ☐TAK ☐ NIE

Jeśli TAK – proszę wymienić jakie ?
.....

Czy kiedykolwiek miał(a) Pan(i) wykonywane badanie CT / MRI / ANGIO/ RTG z użyciem środka kontrastowego ?
☐TAK ☐ NIE

Czy po podaniu Panu/Pani środka kontrastowego wystąpiły reakcje uczuleniowe ?
☐TAK ☐ NIE

DOTYCZY KOBIET: Czy jest Pani w ciąży ? ☐TAK ☐ NIE

ŚWIADOMA ZGODA PACJENTA NA WYKONANIE BADANIA RADIOLOGICZNEGO /TK Z EWENTUALNYM PODANIEM ŚRODKA KONTRASTOWEGO (proszę zakreślić krzyżykiem właściwą odpowiedź):

1.Powyższe pytania zostały przeze mnie przeczytane i są dla mnie zrozumiałe. ☐TAK ☐ NIE
2. Podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. ☐TAK ☐ NIE
3.Uzyskałem(łam) wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie pytania. Znane mi są: rodzaj badania, jego celowość, oczekiwane wyniki i potencjalne zagrożenia mogące wystąpić w ramach wykonywanej diagnostyki.
☐TAK ☐ NIE
4.Zgadzam się na ewentualne zmodyfikowanie sposobu wykonania badania w niezbędnym zakresie, zgodnie z zasadami wiedzy medycznej, jeśli będzie tego wymagała sytuacja. ? ☐TAK ☐ NIE
5.W przypadku konieczności wykonania badania w znieczuleniu ogólnym wyrażam na to zgodę. ?
☐TAK ☐ NIE

6.Zostałem poinformowany/zostałam poinformowana o możliwości powikłań związanych z badaniem i **WYRAŻAM ZGODĘ** na przeprowadzenie badania. ☐TAK ☐ NIE

7.W razie konieczności zastosowania środka kontrastowego **WYRAŻAM ZGODĘ** na jego dożylne podanie świadomy/świadoma możliwości wystąpienia objawów ubocznych. ☐TAK ☐ NIE

.....
Data i czytelny podpis pacjenta lub czytelny podpis przedstawiciela ustawowego pacjenta

8. W przypadku braku zgody na podanie środka kontrastowego przyjmuję pełną odpowiedzialność za konsekwencje opóźnionej lub niepełnej diagnozy.

.....
Data i czytelny podpis pacjenta lub czytelny podpis przedstawiciela ustawowego pacjenta

……
Data Pieczęć i podpis lekarza kwalifikującego do badania diagnostycznego